

## 人免疫球蛋白说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

传播的可能。临床使用时应权衡利弊。

### 【商品名称】

通用名称: 人免疫球蛋白

### 【规格】

300mg/瓶 (0.5%)

### 【用法用量】

预防麻疹: 为预防发病或减轻症状, 可在与麻疹患者

接触后, 立即注射本品, 成人每次 0.5-1.0ml, 儿童

每次 0.1-0.2ml, 每日 1 次, 连用 3 天。

预防乙型肝炎: 成人每次 0.5-1.0ml, 儿童

每次 0.1-0.2ml, 每日 1 次, 连用 3 天。

尚待积累和规范不良反应的监测资料。少数人曾出

现过敏反应, 个别患者发生过敏性休克, 可危及

### 【成份】

主要成份为人免疫球蛋白。本品系由健康人血浆

经低温乙醇沉淀法与层析法分离纯化, 并经

病毒灭活 (S<sub>2</sub>法) 处理, 不含任何病毒。

本品不含防腐剂, 不含任何动物源性成分, 不含

任何有害物质, 不含任何致热原。

### 【性状】

应为无色或淡黄色澄明液体, 可带乳光

或混浊。

【适应症】

1. 预防麻疹、流行性腮腺炎、风疹、水痘、

乙型肝炎、乙型肝炎病毒携带者密切接触者的

**【禁忌】**

于抗体与抗原相互作用起到直接中和毒素与杀灭细

尚不清楚。

2. 有IgA抗体的选择性IgA缺乏者。

感染有一定的作用。

**【注意事项】**

毒理研究：

**【贮藏】**

于2~8℃避光保存和运输。

**【包装】**

每瓶含IgA 300mg/瓶

每瓶含IgA 150mg/瓶

3. 运输及贮存过程中严禁冻结。

**【孕妇及哺乳期妇女用药】**

未专门进行该项针对性试验研究，且无系统可靠的

15年版三部和YBS00252013

未专门进行该项针对性试验研究，且无系统可靠的

《中国药典》202

**【参考文献】**

【批准文号】

准字S20063021：300mg/瓶

**【药物相互作用】**

国药

准字S20063020：150mg/瓶

应单独使用。凡对免疫球蛋白有相互作用的药物可

国药

上市许可持有人】

能会对本品产生相互作用。

【药品

博晖生物制药(河北)有限公司

**【药物过量】**

**【生产企业】**

可能产生变异反应和因剂量大在注射部位造成疼痛感。

企业名称：博晖生物制药(河北)有限公司

生产地址：石家庄市鹿泉绿岛火村开发区香川路6号

**【药理毒理】**

使之 电话号码：0311-83935518

是把免疫球蛋白内含有的大量抗体输给受

到暂时免疫保护状态。由

从低或无免疫状态很快达