




3. 国外上市后监测

国外的国外上市药品还监测到如下不良反应/事件，由于这些不良反应/事件其在上市药品不良反应监测系统中尚属罕见，现将不能确定的药品不良反应：

- (1) 皮肤及其附件损害：史蒂文斯-约翰逊综合征等。
- (2) 神经系统损害：癫痫发作、无菌性脑膜炎等。
- (3) 呼吸器损害：急性呼吸窘迫综合征、肺水肿、支气管痉挛等。
- (4) 血管损害和血液异常：血栓形成等。
- (5) 血液系统损害：血浆粘度增加、溶血反应等。
- (6) 泌尿系统损害：肾功能损害等。

【禁忌】

1. 对免疫球蛋白过敏或有其他严重过敏史者。
2. 有抗IgA抗体的选择性IgA缺乏者。

【注意事项】

本品应在医生指导下使用。

如需要，可以用5%葡萄糖液稀释本品，但稀释液不得用于

静脉输注或注射，以免引起过敏反应。有既往过敏史者慎用。

本品开始输注时，应密切观察患者，不得过快或给他人使用。

有严重代谢紊乱的患者应慎用。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。

本品可能会引起过敏反应，如出现皮疹、荨麻疹、瘙痒、呼吸困难、低血压、休克等，应立即停药并对症治疗。